

Masuri de prevenire a infectarii cu virusul West Nile



Pentru prevenirea infectarii cu virusul West Nile, va transmitem urmatoarele masuri de preventie:

- evitati expunerea la tantari, purtand imbracaminte cu maneca lunga si pantaloni lungi;-**
- utilizati substante chimice repelante de tantari;**
- impiedicati patrunderea tantarilor in casa si folositi plase de protectie;**
- asigurati desecarea baltilor de apa din jurul gospodariei;**
- indepartati recipientele de apa statuta si gunoiul menajer;**

În general, 80 de persoane din 100, care au West Nile, nu au simptome. Acestea pot debuta în primele 15 zile din momentul în care au fost mușcate de țânțar.

Simptomele ușoare pot include: febră, cefalee, senzație de oboseală, lipsa poftei de mâncare, dureri în tot corpul, erupție cutanată, de obicei pe piept, și umflarea ganglionilor limfatici.

In general, un om din 150 poate cunoaște o formă gravă a bolii. Aceasta poate duce la umflarea creierului (encefalita), a măduvei spinării (mielita) sau a țesuturilor din jurul creierului și măduvei spinării (meningită). Se manifestă prin: cefalee severă, febră mare, stare de confuzie, convulsii, slăbiciune musculară sau paralizie și coma.

Dacă experimentați astfel de simptome, e necesar să ajungeti imediat la medic și să faceți analize de sânge.